

Komplikationer i begyndelsen af graviditeten

Patientinformation

Har du komplikationer i begyndelsen af graviditeten?

Hvad kan der være i vejen?

- Meget tidligt i graviditeten er det ofte vanskeligt ved en enkelt undersøgelse at afgøre, hvordan graviditeten vil udvikle sig. Der er i princippet tre muligheder :
 - En normal graviditet.
 - En graviditet, som ender med en abort.
 - En graviditet uden for livmoderen.

Hvilke undersøgelser foretager lægen?

- En almindelig gynækologisk undersøgelse.
- En ultralydskanning, som oftest foregår gennem skeden.
- En blodprøve, som kaldes Serum-HCG (graviditetshormon) .

Hvorledes er forløbet?

- Hvis ultralydsskanningen viser et levende foster i livmoderen, er der ikke grund til bekymring. Yderligere undersøgelser er unødvendige.
- I visse tilfælde kan lægen med sikkerhed afgøre, at graviditeten sidder i livmoderen, men uden at kunne afgøre, om det ender med en normal graviditet eller en abort. I disse tilfælde får du en tid til en ny skanning om 1 uge.
- Endelig er der tilfælde, hvor lægen ikke kan afgøre, om graviditeten sidder i livmoderen eller udenfor. Det er ofte et problem, hvis du ikke er ret langt henne i graviditeten. Du får taget en blodprøve umiddelbart og igen efter to-tre dage. Du kan få svar på blodprøven og oplysning om videre plan ved at ringe på telefon 7843 4647 mellem kl. 13.00 - 15.00.

Forholdsregler:

- Du kan ikke ændre på forløbet ved fx at forholde dig roligt eller ligge i sengen. Vi anbefaler derfor, at du opretholder dine daglige gøremål i den udstrækning, som eventuelle smerter eller blødning tillader.
- ***Indtil vi har afklaret, om graviditeten sidder i livmoderen, er det meget vigtigt, at du kontakter os med det samme, hvis du får mere ondt end almindelige menstruationssmerter. Du kan ringe til sygehuset i Herning døgnet rundt på telefon 7843 0000 og bede om at tale med den vagthavende læge på gynækologisk afdeling.***

Fremtidsudsigter :

- Ved en normal graviditet vil mere end ni ud af ti kvinder gennemføre graviditeten.
- Hvis din graviditet er endt med en abort, får dette ingen betydning, næste gang du bliver gravid. Du har ikke højere risiko for abort, selv om du har aborteret en eller to gange.
- Ser det ud til, at du er gravid uden for livmoderen, bør du sandsynligvis indlægges og have foretaget en kikkertundersøgelse af bughulen i fuld bedøvelse. På den måde kan lægen præcist sige, hvad der er problemet, og oftest kan vi operere dig gennem kikkerten. Lægen i gynækologisk ambulatorium vil forklare dig nærmere, hvad der skal ske.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Regionshospitalet Herning
Telefon (hverdage kl. 09.00 – 12.00) 7843 4600